



עלון הדרכה

לشاיבת מדרכי נשימה עליונות

הוילם יקלין,

ילדכם נזקק לשאייה מדרכי הנשימה העליונות, במטרה להרחיק את ההפרשות שהתבררו ולאפשר נשימה מיטבית. לצורך כך סופק לכם מכשיר שאיבה וצדד נלווה, וקיבלתם הדרכה מעשית מצוות המכון.

בעلون זה ריכזוינו עבורכם מידע והנחיות כיצד לבצע את פעולת השאייה בבית. חשוב שתכירו את ההנחיות וכך תוכלו להעניק טיפול מציל חיים לילדכם.

צאות מכון ריאות ישמש לסייע לכם בכל שאלה או בעיה המתעוררת.



22600 נסיעות
צאות מכון ריאות

מקצועי
מרכז שנайдר לטיפול الأطفال בישראל
Schnieder Children's Medical Center of Israel

מצב	סימנים	התערבות מומלצת
חסימת נתיב אויר על-ידי הפרשות	<ul style="list-style-type: none"> אי שקט קוצר נשימה דופק מהיר הזהה רעשים וشمימות ירידה ברוויי החמצן אצל ילדים המחוברים לממד סטנדרטיה (מתוחת ל-90% או מתחת לערך הסטנדרטיה הבסיסי של הילד) 	<ul style="list-style-type: none"> ביצוע שאיבה אינוליזיה (לרכיב החפרשות על-פי הנחיה רפואי) מתן חמצן הפסקה ארוכה יותר בין שאיבות אם אין הטבה – יש להתקשר או לפנות למוקד רפואי אם יש מכשיר משעל ונדר כיו"ש הפרשות מרובות, ניתן לבצע טיפול בשעל ולהזכיר שאיבה חוזרת
דימום, הפרשה דמיות הפה (במהלך ביצוע השאייה)	lezarot dmiotot	<ul style="list-style-type: none"> lezarot at shaiba lachkot c-5 duktot am hdimom la posuk ish lponot lemin bavit cholim
הקאה	הקאה תוך כדי שאיבה	<ul style="list-style-type: none"> אם הילד שוכב על גבו, יש לסובב את ראשו או את כל גבו הצד. אם הילד ישב, יש להשען את גבו קדימה, כדי לשמור על דרכי נשימה פתוחות אם יש עדין הפרשות גלויות, יש לשאוב שוב ללא נגיעה בחלק האחורי של הפה, כדי למנוע כניסה הפרשות לריאות
הפסיקת נשימה	shinui be tshev hanafim (chhol/adom)	<ul style="list-style-type: none"> ירידה בדופק אי-שקט קיצוני חרס בתנועת בית החזה אפטיה ירידה בסטנדרטיה (מתוחת ל-90% או מתחת לערך הסטנדרטיה הבסיסי של הילד)



אם חל שינוי במצבו הבסיסי של הילד
יש לפנות מיד לסייע רפואי או למוקד רפואי

ברכת בריאות טובנה,
צאות מכון ריאות
טלפון: 03-9253654 | cmreotmail@clalit.org.il
www.schneider.org.il/reot



בailo מצלבים יש צורך לבצע שאיבה?

- חשבו להסביר לילדכם על הפעולה, להרני ולהביא ככל שניתן ליד שיתוף פעולה – בהתאם לגיל ולמצב הרפוא.
- בשאייה מתוכננת, כמו לאחר פיזיותרפיה או משעל (לילדים שמתופלים במכשיר זה), יש להימנע מואכל ושתייה לפחות שעה לפני הפעולה.
- אם קיימת המלצה רפואי, יש לחבר את ילדכם למכשיר סנסור סטורציה (מד-חמצן).

כיצד לבצע את פעולה השאייה?

1. יש לרוחץ ידיים לפני הטיפול.
2. לחבר את קטטר השאייה ל-Finger Tip.
3. לחבר את הקט – Tip Finger לצינור מכשיר השאייה.
4. להדליק את המכשיר (ולוואוד אוי קיים לחץ).
5. לרוחץ ידיים שוב ולעתות כפפות (מומלץ).
6. להחדיר את קטטר השאייה לתוך חלל הפה, לכיוון הלוע עד קו השיניים האחוריות – מומלץ לבצע את הפעולה עם היד הדומיננטית.
7. עם היד השנייה, יש לסגור לשיגורן עם האצבע את פתח הקט – Tip – פעולה זו יוצרת ואקום וכר מתחילה תחילת השאייה.
8. יש למשוך החוצה את הקטטר בתנועה סיבובית עדינה, כפי שהוזדגם בהדריכה בעל פה. אם נתקלתם בהנגדות, עצרו את פעולה השאייה, משכו את הקטטר מעט החוצה ונסו שוב. שימו לב: אסור לשאוב יותר מ-10 שניות רצוף בכל פעם.
9. ניתן לחזור על פעולה השאייה מספר פעמים עד לפינוי ההפרסות.
10. לאחר שאיבה מוחלט הפה ניתן לשאוב הפרשנות גם מהאף, במיידת הצורך.
11. אם יש הפרשנות ספיקות באף, ניתן להזילף 0.5 מיליליטר (מ"ל) של תמייסת 0.9% NaCl (סליין) לתוך האף, בעזרה מזרק ולשאוב את ההפרסות.
12. בסיום השאיבה יש לשלוט את צנרת המכשיר במים נקיים שהכנתם בכוס.

בסיום הפעולה

- יש לכבות את מכונת השאייה.
- יש לנוקוט ולרוקן את מיכל הסקשן, על פי ההנחיות של יצרן המכשיר.
- יש לרוחץ ידיים.

במשך כל פעולה השאייה, יש לשימוש לב לצבע הפנים של היד ולתנוונות הנשימה שלו, כדי לזהות ככל המוקדם מצלבים הדורשים התערבות (פירוט בטבלה בהמשך)



- על פי ההנחייה שקיבלתם מהרווא.
- ריבוי הפרשות בדרכי נשימה עליונות.
- לאחר פיזיותרפיה נשימית.
- נשימה עם חרוחרים.
- במצבים חריגיים כמו: חיוורון, כחלון או כל שינוי במצב סביבה הפה או הציפוריוניים, המלווה בקוצר נשימה.

מוסגים חשובים שצרכי להכיר

- סקשן suction – שאיבה.
- קטטר שאיבה – צינורות שאיבה.
- Finger Tip – מחבר בין קטטר השאייה לצינור של מכשיר השאייה.
- סנסור סטורציה – מד רמת ריאו חמצן בدم.

הציוד הנדרש לשאייה

1. מכשיר שאיבה (סקשן).
2. מחבר – Finger Tip.
3. מכשיר מד-חמצן וסנסור סטורציה – אם יש המלצה רפואיות לכך.
4. מקור חמצן (בלון או מחולל) – אם יש המלצה רפואיות לכך.
5. כפפות (מומלץ).
6. תמייסת מי מליח 0.9% NaCl במשקל 2 מיליליטר (מ"ל) לדילול ההפרשות באף, לפי ה指挥 (ניתן לרכוש בכל בית מרפחת).
7. קטטר שאיבה (בהתאם לגודל שהומלץ בהדריכה).
8. כוס עם מים (לשתיפת קטטר שאיבה).

